

## Notiziario fitosanitario


N. 11/ATO8/2019

Valido dal 17/04 al 29/04/2019

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 788178, fax 070 789607

### Consigli colturali e difesa



#### Olivo

Fase fenologica: Ripresa vegetativa - germogliamento [scalaPFP 2 \(B1 e B2\)](#) [scalaBBCH 01-19](#)

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina): soprattutto sulle varietà particolarmente sensibili come la Pit'ze Carroga, dove nelle annate precedenti si sono avute precoci cascole e marcati problemi di Lebbra e Marciumi della drupa, si consiglia di intervenire proprio in questo periodo con prodotti specifici mesosistemici (Tryfloxystrobin con Tebuconazolo oppure Pyraclostrobin) e solo fino alla prefioritura, tenendo conto che è consentito un solo ed unico intervento, e che il tempo di carenza è di circa 120 giorni. L'intervento è consigliato anche in situazioni dove gli oliveti sono in stato di semi abbandono e fortemente defogliati da Occhio di Pavone e Piombatura. In queste situazioni sarà necessario mantenere protetta la vegetazione con successivi trattamenti a base di Rame o Dodina.



#### Vite

Fase fenologica: Foglie distese [scalaPFP E](#) [scalaBBCH 11-19](#)

Peronospora (Plasmopara viticola): poichè si sono verificate piogge infettanti e considerando la precedente stagione, si consiglia di intervenire immediatamente con prodotti di copertura tradizionali quali prodotti a base di Rame, Ditiocarbamati o Folpet soprattutto dove la vegetazione è particolarmente sviluppata con almeno 5 cm di diametro di foglia e 10 cm di lunghezza del tralcio.

Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator): dove nella annate precedenti si sono verificati attacchi diffusi, intervenire con prodotti di copertura tradizionali o con affinità con le cere quali zolfi, Metil dinocap e Spiroxamine ecc., che risultano i più efficaci considerando lo stadio fenologico (affinchè gli zolfi siano efficaci si ricorda che quelli bagnabili sono particolarmente attivi a partire da 15/16 ° C e quelli in polvere da 19/20 ° C).

#### Pesco

Fase fenologica: Allegagione

Bolla del pesco (Taphrina deformans): dove si sono verificati attacchi di bolla, intervenire al più presto con Triazoli e Dodina, validi anche contro Monilia, Corineo, Fusicocco, Mal bianco ecc., in questo periodo evitare l'uso di prodotti a base di rame perchè fitotossici sulle drupacee in vegetazione.

