

Notiziario fitosanitario

N. 255/ATO8/2022

Valido dal 09/05 al 23/05/2022

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 788178, fax 070 789607

Consigli colturali e difesa



Vite

Fase fenologica: Grappoli visibili [scalaPFP F](#) [scalaBBCH 53](#)

Peronospora (Plasmopara viticola): I dati delle centraline meteorologiche del SAR, nel comprensorio del Parteolla, indicano una precipitazione media di 50mm negli ultimi 4-5 giorni. Considerando gli eventi piovosi delle scorse settimane e le emissioni dei modelli matematici di previsione, si ritiene altamente probabile che si verifichino le infezioni primarie della crittogama. Considerando anche la fase fenologica, si consiglia d'intervenire al più presto su tutte le varietà, sia con prodotti di contatto che endoterapici. Valutare che quest'ultimi vengono assorbiti dalla vegetazione in circa 2 ore, mentre i prodotti di contatto risultano dilavati dopo una precipitazione di circa 20mm. A partire dal 10/05/22 non si dovrebbero avere piogge per circa una settimana. Comunque verificare scrupolosamente le previsioni a 24-48 ore prima di effettuare il trattamento e valutare attentamente i tempi di persistenza dei prodotti indicati in etichetta.

Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator): sono stati segnalati casi d'infezione da Oidio su vigneti che hanno avuto forti attacchi da parte del fungo nella stagione precedente. Considerando lo stadio fenologico, si consiglia d'intervenire su tutte le varietà con principi attivi sistemici o locosistemici. Conviene utilizzare i prodotti di contatto e pulverulenti come lo Zolfo quando le condizioni meteorologiche risultano più favorevoli (Assenza di piogge e temperature più alte).



Olivo

Fase fenologica: Inizio fioritura [scalaPFP --](#) [scalaBBCH 60](#)

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina): si riscontra su molte varietà l'apertura dei fiori. Al momento si consiglia qualsiasi trattamento, riservando eventuali interventi alla fase di fine fioritura-allegagione.

Pesco

Fase fenologica: Allegagione

Bolla del pesco (*Taphrina deformans*): intervenire sui pescheti in cui i trattamenti di fine inverno-inizio primavera non sono riusciti a controllare la crittogama. Utilizzare prodotti endoterapici e controllare attentamente in etichetta le registrazioni e la fase fenologica in cui è autorizzato l'uso del prodotto. Alcuni principi attivi registrati su Bolla sono efficaci anche nei confronti di altre crittogame quali Oidio e Monilia.



Agrumi

Fase fenologica: Fioritura

:: in particolare si ricorda che durante la fioritura non sono ammesse irrorazioni a base di insetticidi. Fitofagi come gli afidi sono perfettamente controllati da predatori e parassitoidi. Eventualmente in presenza di abbondanti quantità di melata, si possono utilizzare appositi tensioattivi registrati sulla coltura.